



Gastroskopi

Allmänt

Gastroskopi är en undersökning där man betraktar matstrupe, magsäck och övre delen av tolvfingertarmen inifrån med hjälp av ett smalt och böjligt instrument, som förs in via munnen. Med hjälp av videoteknik överförs bilden till en TV-skärm. Undersökningen visar om det finns inflammation, sår, polyper/tumörer i slemhinnan och man kan även ta vävnadsprov från förändringar.

Förberedelser

Undersökningen utförs på fastande mage, dvs. ingen mat eller dryck får intas 6 timmar före undersökningen. Om man använder blodförtunnande medicin (ex Waran) är det viktigt att man meddelar mottagningen detta eller om man har en inopererad hjärtklaff.

Hur går undersökningen till?

Före undersökningen ges bedövningsmedel i svalget i form av spray, detta för att dämpa kväljningsreflexerna. Vid undersökningen ligger man på vänster sida. En bitring placeras mellan tänderna för att skydda instrumentet. Instrumentet förs in via munnen ner i matstrupen, magsäcken och ut i tolvfingertarmen. Varken instrumentet eller bedövningssprayet påverkar luftvägar/andning. Bortsett från vissa obehag vid själva nedsväljningen av "slangen" brukar inte undersökningen medföra några större besvär. Vid undersökningen blåser man via instrumentet in luft i magsäcken för att få bättre överblick. Rapningar kan därför förekomma både under och efter undersökningen. I samband med undersökningen kan läkaren ta vävnadsprover från mag- och tarmslemhinna. Hela undersökningen tar cirka 5 minuter.

Efter undersökningen

Läkaren som har gjort undersökningen ger besked om resultatet direkt och vid behov recept på lämplig medicin. Om vävnadsbitar skickas för mikroskopisk undersökning kommer svaret när analysen av dessa är klara.

Mat och dryck får intagas när bedövningen släppt av helt i svalget, efter ca 30-60 min.

Magnus Berne
Specialistläkare i allmänkirurgi

Magnus Campanello
Specialistläkare i allmänkirurgi