



Patientinformation – Kapselundersökning

Du har fått en tid för kapselundersökning. Undersökningen innebär att du sväljer en kapsel som sedan passerar genom mag- och tarmkanalen samtidigt som den tar bilder av tunntarmen.

Du får lov att äta fram till kl. 18:00 dagen före undersökningen. Fram till 6 timmar före undersökningen får du dricka klar dryck så som vatten, te/kaffe (utan mjölk) och saft. Därefter ska du vara fastande.

När du kommer till mottagningen kommer du först att få dricka en liten kopp med Minifom (15ml) som minskar bubblor som kan skymma sikten i tarmen. Du kommer även få ett läkemedel som heter Erytromycin som påskyndar magsäckstömningen. Därefter får du svälja kapseln, som är i storlek av en antibiotikatablett.

2 timmar efter att du svält kapseln får du börja dricka klar dryck. Efter 4 timmar kan du börja äta som vanligt.

I normalfall passerar kapseln mag- tarmkanalen inom 48 timmar. För att underlätta tarmpassagen är det viktigt att röra på sig och dricka vatten.

Sjuksköterskan går igenom hur du ska hantera kapseln när den har kommit ut. Du kommer även få med dig ett kit med instruktioner hem. För att se en instruktionsfilm kan du gå in på: <https://capsovision.com/products/capsoretrieve>

I samband med besöket bokas ett besök för återlämning av kapseln och ett återbesök till din läkare för genomgång av svaret.

Du får inte genomgå MR-undersökning så länge kapseln finns i kroppen.